

Dickdarm und Enddarm (C18-C21) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1991-2018)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾ N	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
		1	3	5	10
Insgesamt					
1991-1995	20.949	73,7	58,7	52,4	47,9
1996-2000	23.816	75,6	61,4	55,5	49,9
2001-2005	24.146	78,8	65,7	59,5	54,0
2006-2010	23.717	81,0	68,0	61,8	55,7
2011-2015	22.744	81,2	69,0	62,8	-
2016-2018	12.982	81,5	68,9	-	-
Männer					
1991-1995	10.553	75,1	59,9	53,1	47,6
1996-2000	12.414	76,8	62,4	55,4	48,8
2001-2005	13.039	79,7	66,8	59,9	53,6
2006-2010	13.335	81,6	68,9	62,4	55,5
2011-2015	12.992	82,1	69,5	62,7	-
2016-2018	7.477	82,5	69,1	-	-
Frauen					
1991-1995	10.396	72,3	57,5	51,8	48,2
1996-2000	11.402	74,2	60,4	55,7	51,0
2001-2005	11.107	77,7	64,3	59,0	54,5
2006-2010	10.382	80,1	67,0	61,1	56,1
2011-2015	9.752	80,2	68,2	62,9	-
2016-2018	5.505	80,2	68,7	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.12.2020). Erstellt am 21.12.2020. 1) Ende des Follow-up 31.12.2019. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.